

Chefärztin Dr. med. Viola Moser
 Fachärztin für Plastische und
 Ästhetische Chirurgie

**Sprechstunden durch unser Fachärzteam
 nach telefonischer Vereinbarung:**

Schlosspark-Klinik Plastische und Handchirurgie
 Zentrum für Ästhetisch-Plast. Chirurgie
 Heubnerweg 2, 14059 Berlin
 Manuela Marohn (Sekretariat)
 Telefon (030) 32 64-12 44
 Fax (030) 32 64-12 43
 E-Mail manuela.marohn
 @schlosspark-klinik.de
 www.schlosspark-klinik.de


**Park-Klinik
 Weißensee** Plastische und Ästhetische
 Chirurgie, Handchirurgie
 Schönstraße 80, 13086 Berlin
 Mareen Wolter (Sekretariat)
 Telefon (030) 96 28-35 03
 Fax (030) 96 28-34 26
 E-Mail wolter@park-klinik.com
 www.park-klinik.com

Partnerkliniken



SCHLOSSPARK  KLINIK

Heubnerweg 2
 14059 Berlin




1 Schlosspark-Klinik **2** CT/MRT **3** Schlosspark-Hotel

S-Bahn 41, 42, 46 Westend, umsteigen in Bus 309
 U-Bahn 2 Sophie-Charlotte-Platz, umsteigen in Bus 309
 U-Bahn 7 Wilmsdorfer Str., umsteigen in Bus 309
Bus M45 Sophie-Charlotten-Straße
 umsteigen in Bus 309
Bus 309 Schlosspark-Klinik

PARK-KLINIK WEIßSENSEE

Schönstraße 80
 13086 Berlin



Bus 158, 255
Tram 12, M13
Tram 12, M4, M13
S-Bahn S8, S41, S42
U-Bahn U2
 Mirbachplatz
 Behaimstraße
 Albertinenstraße
 umsteigen in Bus 255
 Greifswalder Straße
 umsteigen in Tram M4
 S/U-Bahnhof Pankow
 umsteigen in Bus 255

C002/4_09

SCHLOSSPARK  KLINIK
 PARK-KLINIK WEIßSENSEE

Behandlungsschwerpunkte



Plastisch - rekonstruktive Gesichtschirurgie

AKADEMISCHE LEHRKRANKENHÄUSER DER CHARITÉ
 HEALTH PROMOTING HOSPITALS OF THE WHO
 QUALITÄT SZERTIFIZIERT NACH KTQ®

Chirurgie der Lider

Der erste Blick in ein Gesicht führt immer zu den Augen

Funktionelle Lidkorrektur

Ausgeprägte Schlußpflider schränken das Gesichtsfeld ein und sind deshalb eine medizinische Indikation zur operativen Korrektur. Dabei wird überschüssige Lidhaut entfernt und die Operationsnaht unauffällig in die Oberlidfalte gelegt.

Rekonstruktion der Augenlider

Das Ergebnis korrekativer und rekonstruktiver Lidoperationen wird - ebenso wie eine Schönheitsoperation - nach ästhetischen Maßstäben beurteilt. Wir führen entsprechende Operationen bei folgenden Problemen durch:

- Ektropium und Entropium (Fehlstellung nach außen bzw. nach innen)
- Oberlidptosis (hängendes, tiefstehendes Oberlid)
- Gesichtsnervenlähmung (Fazialislähmung) mit schließunfähigem Oberlid
- Lidhautdefekte nach Tumoroperationen oder Verletzungen
- Allschichtige Liddefekte nach Tumoroperationen oder Verletzungen

Tumorchirurgie im Gesicht

Die häufigsten Tumoroperationen im Gesicht werden durchgeführt bei:

- Basaliomen
- Plattenepithelkarzinomen
- Melanomen

Hierdurch entstehen häufig größere Defekte, die unter ästhetischen Gesichtspunkten verschlossen werden müssen. Dafür stehen spezielle Techniken zur Verfügung, z.B. lokale Lappenplastiken oder Hauttransplantationen.

Chirurgie der Ohrmuschel

Ohrkorrektur

Abstehende Ohren wirken sich vor allem auf die seelische Gesundheit negativ aus. Eine operative Korrektur kann die Lebenszufriedenheit steigern und seelische Fehlentwicklungen verhindern. Weil das Ohr bereits im Vorschulalter zu 90 % ausgewachsen ist und anschließend seine Form nicht mehr wesentlich verändert, sind Eingriffe schon vor der Einschulung möglich. Dadurch lässt sich vermeiden, dass das Kind durch seine Klassenkameraden gehänselt wird. Die Operation kann aber auch zu jedem späteren Zeitpunkt vorgenommen werden, bei größeren Kindern und Erwachsenen sogar in örtlicher Betäubung.

Ohrmuschelrekonstruktion

Defekte im Bereich der Ohrmuscheln sind nicht so belastend, wie Defekte im Gesicht - können doch die Ohren unter den Haaren versteckt werden. Dennoch erfahren Erwachsene und Kinder durch eine gelungene operative Verbesserung oder Rekonstruktion eine wesentliche psychische Entlastung und mehr Sicherheit im sozialen Umfeld. Ohrmuschelrekonstruktionen werden durchgeführt bei:

- angeborenen Defekten der Ohrmuschel unterschiedlicher Schweregrade bis hin zu verkümmerten oder fehlenden Ohranlagen (Mikrotie),
- erworbenen Defekten von Teilen der Ohrmuschel bis zum Totalverlust der Ohrmuschel durch Unfall, Verbrennung oder Tumoroperation.

Chirurgie der Nase

Funktionelle Nasenkorrektur

Das Anfeuchten, Reinigen und Erwärmen der Atemluft ist eine wesentliche Funktion der Nase. Wenn es hier zu Störungen kommt, führt das zu chronischen Kopfschmerzen, Schnarchen, Schlafstörungen und chronischen Infekten der Nasennebenhöhlen.

Als Ursachen einer Nasenatmungsbehinderung kommen in Betracht:

- Schiefstehende Nasenscheidewand (Septumdeviation)
- Schwellungen der Nasenmuscheln (Nasenmuschelhyperplasie)
- Nasenpolypen
- Traumatisch bedingte Vernarbungen und bindegewebige Verwachsungen (Synechien)
- Funktionsstörungen der Nasenklappe

Bei einer funktionellen Nasenkorrektur werden diese Störungen behoben.

Nasenrekonstruktion

Substanzdefekte der Nase entstehen meist, wenn bösartige Tumoren der äußeren Nasenhaut entfernt werden müssen. Aber auch Defekte nach Unfällen, Verbrennungen oder Hundebissen sind nicht selten. Nasenrekonstruktionen werden nach den Prinzipien der ästhetischen Chirurgie durchgeführt. Das bedeutet, dass nicht nur der Hautdefekt verschlossen, sondern auch die Nasenform bestmöglich wiederhergestellt wird. Außerdem wird auf einen möglichst unauffälligen Narbenverlauf geachtet.

Chirurgie der Lippen (Rekonstruktion)

Am Übergang vom Lippenrot zur umgebenden Haut sind bereits Abweichungen von einem Millimeter sichtbar. Daher ist bei Lippenrekonstruktionen ein exaktes Vorgehen nach den Maßgaben der ästhetischen Chirurgie wichtig. Meist werden Rekonstruktionen im Bereich der Lippen nach Entfernung von Tumoren der Lippenhaut erforderlich, aber auch nach Tierbissen sind Verletzungen der Lippen nicht selten. Defekte bis zu einem Viertel der Lippe können in der Regel primär verschlossen werden. Dem plastischen Chirurgen stehen aber auch Techniken zur Verfügung, um größere Teile oder sogar eine gesamte Lippe zu ersetzen. Dabei kann beispielsweise eine Verlagerung aus der jeweils nicht betroffenen Ober- bzw. Unterlippe oder eine Kombination aus lokalen Lappenplastiken mit Verlagerung der Mund- oder Zungenschleimhaut angewendet werden.