

Aktuelles Studienangebot des Brustzentrums **der Park-Klinik Weißensee in Kooperation mit** **dem Studienmanagement der Praxisklinik Lichtenberg** **und der Praxis für Hämatologie/Onkologie Wisbyer Str.**

Operative Studien:

INSEMA (Studie der GBG, NOGGO, AGO, WSG)

Prospektive, randomisierte Multi-Center-Studie in der operativen Therapie:
Vergleich der axill. Sentinel lymph node biopsy vs keine axilläre OP bei Mammakarzinom im
Frühstadium

Anmerkung: Studieneinschluss Brustzentrum Park-Klinik Weißensee

Neoadjuvantes Studienangebot (Chemotherapie):

GeparOLA

Eine randomisierte Phase II-Studie zum Vergleich von Paclitaxel/Olaparib versus Paclitaxel /
Carboplatin gefolgt von Epirubicin / Cyclophosphamid als neoadjuvante Behandlung von
Patienten mit HER2-negativem primären Brustkrebs mit homologen rekombinanten Mangel
(HRD) [HRD Patienten mit abträglichen Tumor oder Keimbahn BRCA 1/2 Mutationen und / oder
HRD-Score hoch] (GeparOLA)

Anmerkung: Ein Studieneinschluss ist über die Praxisklinik Möllendorffstr. möglich

Adjuvantes Studienangebot (Chemotherapie):

OLYMPIA-Studie (GBG)

Eine randomisierte, doppelblinde, zweiarmige, Placebo-kontrollierte, multizentrische Phase III
Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Olaparib versus Placebo als
adjuvante Behandlung bei Patientinnen mit BRCA 1/2 Mutation und Hochrisiko HER2-
negativem primärem Brustkrebs, welche die lokale Behandlung und neoadjuvante oder
adjuvante Chemotherapie endgültig abgeschlossen haben. Zur Zeit können nur Triple negative
Patientinnen eingeschlossen werden.

Anmerkung: Ein Studieneinschluss erfolgt über die Praxisklinik Möllendorffstr.

Adjuvantes Studienangebot (Strahlentherapie):

Strahlentherapie-Studie: Hypofraktionierte RT mit simultan integriertem Boost vs. Standard-Fraktionierung (HYXPOSIB)

Prospektive, randomisierte Phase III Therapieoptimierungs-Studie

Anmerkung: Ein Studieneinschluss erfolgt über das MVZ Strahlentherapie Charité, Vivantes

Studien für die metastasierte Situation:

Anmerkung: Ein Studieneinschluss für die folgenden Studien erfolgt über die Praxisklinik Möllendorffstr.

RIBECCA

Phase-IIIb-Studie bei metastasiertem oder lokal fortgeschrittenem Brustkrebs bei postmenopausalen Patn. (firstline Ribociclib + Letrozol (nur noch Arm A)) bei HR pos. Her2 neg.

DESIREE

Phase-II-Studie bei metastasiertem oder lokal fortgeschrittenem Brustkrebs bei postmenopausalen Patn. ohne Indikation zu einer Chemotherapie (Exemestan + Everolimus bei HR pos. und Her2 neg. Patn.

Studien für die besondere Situation:

BCP-Studie (GBG): Mammakarzinom in der Schwangerschaft

prospektive und retrospektive Registrierstudie zur Diagnostik und Therapie des Mammakarzinoms in der Schwangerschaft.